



Foto 1: Gaviota de Audouin adulta. Obsérvese la coloración del ojo, pico y patas que la diferencian de la Gaviota Patiamarilla (*Larus michahellis*).
Foto David Bigas.



Foto 2: La Gaviota Patiamarilla adulta tiene un aspecto algo más robusto, y se caracteriza por el pico, iris y patas de color amarillo.
Foto Carlos Pache.



Foto 3: Cuando ambas especies están juntas las diferencias son muy notables. A la izquierda una Gaviota de Audouin y detrás a la derecha una Gaviota Patiamarilla.
Foto Ricard Gutiérrez.



Foto 4: La Gaviota de Audouin es una especie gregaria.
Foto David Bigas.



Foto 5 y 6: En vuelo también se pueden apreciar las diferencias entre los ejemplares adultos de ambas especies. A la izquierda una Gaviota de Audouin y a la derecha una Gaviota Patiamarilla. Fotos Carlos Pache.



Foto 7: Se posan frecuentemente en el mar.
Foto Lalo Ventoso.



Foto 8: Gaviota de Audouin de primer año en vuelo, en la que se puede apreciar la característica franja blanca que recorre longitudinalmente el ala por la parte inferior.



Foto 9: Los ejemplares de primer año de Gaviota de Audouin se caracterizan por la coloración gris uniforme de cabeza, cuello, pecho y abdomen, así como por tener las patas oscuras. Foto David Bigas.



Foto 10: Los ejemplares de primer año de Gaviota Patiamarilla se caracterizan por la coloración más clara de cabeza y partes inferiores, las caules se encuentran finamente moteadas, y por la coloración rosácea de las patas.



Foto 11: En primer plano una Gaviota Patiamarilla de primer año flanqueada por dos gaviotas de Audouin de primer año. Se pueden apreciar muy bien las diferencias antes mencionadas. Foto David Bigas.



Fotos 13 y 14: Aspecto característico de un ejemplar adulto de Gaviota de Audouin emitiendo el reclamo durante el período reproductor. El ave acaba la emisión con la cabeza hacia arriba. Fotos F. J. Mingorance.



Foto 15: Nido de Gaviota de Audouin. La puesta puede variar de uno a tres huevos. Foto Jordi Muntaner.



Foto 16: Adulto alimentando a un pollo mediano. Foto F. J. Mingorance.



Foto 17: En 1988 se inició en España el anillamiento de Gaviota de Audouin con anillas de lectura a distancia.



Foto 18: Jordi Muntaner leyendo anillas en la colonia de Na Guardis (Mallorca) en julio de 2000. Al fondo se ve el archipiélago de Cabrera.



Foto 19: El enredo con líneas de pescar de nylon es una de las causas de mortalidad adulta más patente observada en las islas Baleares. Ejemplares adultos hallados muertos en la misma línea en la colonia de cría de la isla de Caragolé (Ibiza) en mayo de 2003. Foto Jordi Muntaner.



Foto 20: Pollos de Gaviota de Audouin de pocas horas de vida. Foto Jordi Muntaner.



Foto 21: Típico aspecto de una colonia insular de Gaviota de Audouin. Isla de Na Plana (Cabrera, Mallorca). Foto Jordi Muntaner.



Foto 22: Punta de la Banya (Delta del Ebro, Tarragona, España), en donde se encuentra la mayor colonia del mundo de Gaviota de Audouin.



Foto 23: Islas Columbretes (Castellón, España). En los islotes que rodean a la isla principal se instala una pequeña colonia de Gaviota de Audouin. Foto Generalitat Valenciana.



Foto 24: Isla Grosa (Murcia, España). Entre 1988 y 1989 se instaló una colonia de Gaviota de Audouin que, actualmente, es la tercera más importante del mundo. Foto Consejería de Agua y Medio Ambiente de la Región de Murcia.



Foto 25: Isla de Alborán.



Foto 26: Islas Chafarinas, en donde, actualmente, se encuentra la segunda colonia más importante del mundo de Gaviota de Audouin. A la izquierda la isla de Isabel II y a la derecha Rey. No aparece Congreso. Rey es la más intensamente utilizada por la especie. Foto Jordi Muntaner.



Foto 27: Isla de Formentor (bahía de Pollença, Mallorca), localidad ocupada por una pequeña colonia. Foto Vicenç Matas (Archivo fotográfico de la Conselleria de Medi Ambient).



Foto 28: La punta de Ses Meleres (costa este de Mallorca), en el centro de la fotografía, es una de las pocas colonias de las islas Baleares que no se sitúa en islotes. Foto Vicenç Matas (Archivo fotográfico de la Conselleria de Medi Ambient).



Foto 29: Islotes del sur de Mallorca). A la izquierda na Pelada, en el centro na Moltona y a la derecha, frente a la Colonia de Sant Jordi, na Guardis. Foto Vicenç Matas (Archivo fotográfico de la Conselleria de Medi Ambient).



Foto 30: Isla de Sa Dragonera (suroeste de Mallorca). En este Parque Natural, cada año se ubica una colonia, en uno o más núcleos, en los extremos norte o sur de la isla o en ambos a la vez. Foto Vicenç Matas (Archivo fotográfico de la Conselleria de Medi Ambient).



Foto 31: Islotes del norte del archipiélago de Cabrera (sur de Mallorca). En primer plano la isla de Conills seguida de na Plana y na Pobra. A la izquierda Esponja y al fondo na Foradada. Conills i na Plana han sido las ocupadas con mayor frecuencia. Foto Vicenç Matas (Archivo fotográfico de la Conselleria de Medi Ambient).



Foto 32: Islotes de Fonoll y l'Olló (archipiélago de Cabrera, sur de Mallorca). Fonoll es el más grande de ellos, que han sido ocupados irregularmente por la Gaviota de Audouin. Fot Jordi Muntaner.



Foto 33: Costa norte de Ciutadella (noroeste de Menorca). Costa acantilada poco frecuentada en cuya plataforma superior ha habido una pequeña colonia que ha ido variando de ubicación desde su aparición en 1996. Foto Vicenç Matas (Archivo fotográfico de la Conselleria de Medi Ambient).



Foto 34: Isla de Porros y cabo Cavalleria (norte de Menorca). Esta isla fue la primera localidad ocupada por una colonia de Gaviota de Audouin en la isla de Menorca y ha sido utilizada para la cría regularmente. Foto Vicenç Matas (Archivo fotográfico de la Conselleria de Medi Ambient).



Foto 35: Isla del Aire (sureste de Menorca). La constatación de la cría en esta isla se produjo en 1991. Desde entonces han criado regularmente. Foto Vicenç Matas (Archivo fotográfico de la Conselleria de Medi Ambient).



Foto 36: Isla de Calders (norte de Ibiza). Localidad ocupada irregularmente por una pequeña colonia de Gaviota de Audouin. Foto Jordi Muntaner.



Foto 37: Isla de Tagomago (noreste de Ibiza). Localidad ocupada por lo menos dos años por una colonia pequeña de Gaviota de Audouin. Foto Vicenç Matas (Archivo fotográfico de la Conselleria de Medi Ambient).



Foto 38: Isla de Santa Eulalia (este de Ibiza). Localidad ocupada irregularmente por una colonia de Gaviota de Audouin. Foto Jordi Muntaner.



Foto 39: Isla de Vedrà y Vedranell (suroeste de Ibiza). Impresionantes farallones rocosos en donde ha nidificado irregularmente la Gaviota de Audouin. Foto Vicenç Matas (Archivo fotográfico de la Conselleria de Medi Ambient).



Foto 40: Islas de Espartar y Conillera (oeste de Ibiza). En primer término Espartar, con el islote de Es Frare pegado a su izquierda, y al fondo Conillera. Entre estos islotes se ha producido una alternancia en la ubicación de una colonia de Gaviota de Audouin. Foto Vicenç Matas (Archivo fotográfico de la Conselleria de Medi Ambient).



Foto 41: Isote o escollo de es Frare (oeste de Ibiza). Está pegado al extremo oeste de Espartar y ha albergado colonia de cría en 2002 y 2003. Foto Jordi Muntaner.



Foto 42: Isla de Espardell (Formentera). Situada en el canal de los Freus, entre Ibiza y Formentera, es una localidad ocupada con bastante regularidad por una colonia de cría de Gaviota de Audouin. Foto Vicenç Matas (Archivo fotográfico de la Conselleria de Medi Ambient).